

**ІНСТРУКЦІЯ**  
**для медичного застосування лікарського засобу**

**БРОНХОСТОП® ПАСТИЛКИ**

**Склад:**

*діюча речовина:* екстракт тим'яну трави сухий (Thymi herba);  
1 пастилка містить екстракту тим'яну трави сухого (Thymi herba) (7–13:1) (екстрагент: вода) 59,5 мг;  
*допоміжні речовини:* акація; мальтодекстрин; фруктоза; сорбіту розчин, що не кристалізується (Е 420); кислота лимонна безводна; сахарин натрію; ароматизатор аронії; ягідний ароматизатор; олія мінеральна; віск білий; вода очищена.

**Лікарська форма.** Пастилки.

*Основні фізико-хімічні властивості:* пастилки шестикутної форми, коричневого кольору з фруктовим смаком.

**Фармакотерапевтична група.**

Комбіновані препарати, що застосовуються у разі кашлю та застудних захворювань.  
Код ATX R05C A.

**Фармакологічні властивості.**

*Фармакодинаміка.*

«БРОНХОСТОП® ПАСТИЛКИ» застосовується як відхаркувальний засіб у разі кашлю, пов'язаного із застудою, переважно при довготривалій терапії. Ефірні олії та флавоноїди трави тим'яну (чебрецю) чинять бронхолітичну, секретолітичну та антибактеріальну дію, таким чином сприяють швидкому розрідженню мокротиння, що накопичилось у дихальних шляхах, зменшують кашель, полегшують дихання, а також впливають на збудника інфекції.

Натуральна основа (камедь) сприяє повільному вивільненню діючої речовини, що зумовлює поступове зупинення виділення секрету слизовими оболонками, завдяки чому зменшується подразнення слизових оболонок, активізується слинотік і таким чином слизова оболонка зволожується, тим самим додатково полегшується подразнення від кашлю і зупиняється кашель. Швидко і протягом тривалого часу захищає рецептори слизової оболонки дихальних шляхів від подразнення.

*Фармакокінетика.*

Флавоноїди трави тим'яну (апігенін, лютеолін) розщеплюються кишковою мікрофлорою і добре всмоктуються. Виводяться з організму переважно із сечею у незміненому вигляді або у вигляді метаболітів.

**Клінічні характеристики.**

**Показання.**

Симптоматичне лікування запальних захворювань дихальних шляхів, що супроводжуються кашлем та утрудненим виділенням густого мокротиння, полегшення сухого кашлю та пом'якшення подразнення слизової оболонки рота та глотки.

**Протипоказання.**

- Підвищена чутливість до компонентів лікарського засобу або інших рослин родини губоцвітих (Lamiaceae), а також чутливість до селери та пилку берези (можлива перехресна реакція);
- протипоказано дітям із гострим стенозуючим ларинготрахеїтом в анамнезі;
- астма;
- тяжкі захворювання печінки та нирок.

## ***Взаємодія з іншими лікарськими засобами та інші види взаємодій.***

Дослідження взаємодії не проводилися.

### ***Особливості застосування.***

Якщо під час лікування препаратом погіршується симптоматика та/або з'являються задишка, підвищення температури тіла, гнійне мокротиння, необхідно проконсультуватися з лікарем. Якщо протягом 5 днів симптоматика зберігається, необхідно проконсультуватися з лікарем.

Містить фруктозу та сорбіт, тому якщо у пацієнта встановлена непереносимість деяких цукрів, слід проконсультуватися з лікарем, перш ніж приймати цей лікарський засіб.

1 пастилка відповідає приблизно 0,1 вуглеводної одиниці. Це слід враховувати пацієнтам, хворим на цукровий діабет.

Через ризик випадкового ковтання цілої пастилки не рекомендується застосовувати дітям віком до 6 років.

### ***Застосування у період вагітності або годування груддю.***

Через відсутність достатніх даних не рекомендується застосовувати препарат у період вагітності та годування груддю.

### ***Здатність впливати на швидкість реакції при керуванні автотранспортом або іншими механізмами.***

Не встановлена.

### ***Спосіб застосування та дози.***

Для перорального застосування (тримати у ротовій порожнині до повного розсмоктування).

Застосовувати дорослим та дітям віком від 12 років по 1–2 пастилки кожні 3–4 години (4–6 разів на добу). Дітям віком від 6 до 12 років – по 1 пастилці тричі на день.

Тривалість лікування не повинна перевищувати 5 днів, можливість подальшого застосування визначається лікарем.

### ***Діти.***

Застосовувати дітям віком від 6 років.

### ***Передозування.***

Відсутні відомості щодо випадків передозування.

При випадковому передозуванні слід припинити застосування лікарського засобу та звернутися до лікаря.

### ***Побічні реакції.***

При застосуванні препаратів, які містять тим'ян, спостерігалися реакції підвищеної чутливості, включаючи випадок анафілактичного шоку і набряку Квінке. Можливі задишка, висипання, крапив'янка, шлунково-кишкові розлади (включаючи спазми, нудоту, блювання, діарею).

У разі появи будь-яких небажаних реакцій слід припинити лікування та звернутися до лікаря.

### ***Термін придатності.***

3 роки.

### ***Умови зберігання.***

Зберігати в оригінальній упаковці при температурі не вище 25 °C.  
Зберігати у недоступному для дітей місці.

**Упаковка.**

По 10 пастилок у блістері, по 2 блістери у картонній коробці.

**Категорія відпуску.**

Без рецепта.

**Виробник.**

Квізда Фарма ГмбХ.

**Місцезнаходження виробника та його адреса місця провадження діяльності.**  
Еффінгергассе 21, 1160 Відень, Австрія.