

ІНСТРУКЦІЯ
для медичного застосування лікарського засобу
ІНГАЛІПТ-ЗДОРОВ'Я ФОРТЕ З РОМАШКОЮ
(INGALIPT-ZDOROVYE FORTE WITH SAMOMILE)
Всі ціни на препарат **ІНГАЛІПТ-ЗДОРОВ'Я ФОРТЕ З РОМАШКОЮ**
можна знайти на сайті doc.ua

Склад:

діючі речовини: 1 балон (30 мл) містить стрептоциду розчинного 0,75 г, сульфатіазолу натрію у перерахуванні на сульфатіазол натрію безводний 0,54 г, тимолу 0,015 г, олії евкаліптової 0,015 г, олії м'яти перцевої 0,015 г, шавлії лікарської листя екстракту рідкого (1:10) (екстрагент — етанол 70 %) 1,26 г, ромашки екстракту рідкого (6:10) (екстрагент — етанол 50 %) 1,26 г; 1 флакон (50 мл) містить стрептоциду розчинного 0,75 г, сульфатіазолу натрію безводного 0,25 г, олії евкаліптової 0,25 г, олії м'яти перцевої 0,25 г, шавлії лікарської листя екстракту рідкого (1:10) (екстрагент — етанол 70 %) 2,1 г, ромашки екстракту рідкого (6:10) (екстрагент — етанол 50 %) 2,1 г;

допоміжні речовини: етанол 96 %, цукор-рафінад, гліцерин, полісорбат, вода очищена.

Лікарська форма. Спрей для ротової порожнини.

Основні фізико-хімічні властивості: прозора рідина від жовтого до коричневого кольору з характерним запахом.

Фармакотерапевтична група. Засоби, що діють на респіраторну систему. Препарати, що застосовуються при захворюваннях горла. Антисептики. Код ATX R02A A20.

Фармакологічні властивості.

Фармакодинаміка. Фармакологічні ефекти препарату обумовлені дією компонентів, що входять до його складу. Стрептоцид розчинний і сульфатіазол натрію чинять антимікробну дію щодо грампозитивних і грамнегативних бактерій, що спричиняють захворювання порожнини рота і глотки. Тимол має антисептичну, відхаркувальну і спазмолітичну дію. Олія евкаліптова має протизапальну і антисептичну активність. Шавлія чинить інтенсивну протимікробну дію, що підсилюється дією евкаліптової олії. Олія м'яти перцевої при нанесенні на слизові оболонки чинить помірний місцевоанестезуючий ефект. Екстракт ромашки, поряд з протизапальною і протимікробною дією, стимулює регенерацію тканин.

Комбінація вказаних компонентів препарату забезпечує комплексну патогенетичну терапію запальних захворювань слизової оболонки ротової порожнини і верхніх дихальних шляхів. Препарат виявляє протизапальний, протимікробний і протигрибковий ефекти; активний щодо грампозитивних і грамнегативних бактерій, а також грибів роду *Candida*.

Клінічні характеристики.

Показання. Місцеве лікування інфекційно-запальних захворювань ЛОР-органів і слизової оболонки порожнини рота (тонзиліт, фарингіт, ларингіт, афтозний і виразковий стоматит).

Протипоказання. Підвищена чутливість до компонентів препарату, наявність в анамнезі тяжких токсико-алергічних реакцій на сульфаниламіди.

Взаємодія з іншими лікарськими засобами та інші види взаємодій. Якщо Ви приймаєте будь-які інші лікарські засоби, обов'язково проконсультуйтесь з лікарем щодо можливості застосування препарату!

Можливе послаблення протимікробної дії препарату при одночасному застосуванні з препаратами — похідними параамінобензойної кислоти (новокаїн, анестезин, дикаїн).

Особливості застосування. Перед застосуванням препарату, особливо при схильності до

алергії, проконсультуйтесь з лікарем! Без консультації лікаря не застосовуйте препарат надалі встановлений термін!

Одразу язково повідомте лікарю про Вашу попередню реакцію на прийом препаратів цієї групи.

Неприпустиме попадання препарату в очі. Перед застосуванням препарату рекомендується прополоскати порожнину рота теплою кип'яченою водою; з уражених ділянок порожнини рота (виразки ерозів) за допомогою стерильних тампонів видаляти некротичний матеріал (вирощування порожнини рота препаратором слід утримуватися від прийому та вправдовж 15—30 хв.).

При застосуванні препараторів дітям від 3 до 12 років щоденна одноразова доза препарату, яка розпливача за 2 секунди містить 0,0002—0,0007 мг/кг (15—24 мкг/кг) 0,0004—0,0015 мг/кг, на віком 6—12 років (Маса тіла 21—38 кг).

Препарат містить цукор, що слід враховувати хворим на цукровий діабет і пацієнтам з вродженою непереносимістю фруктози, порушенням всмоктування глюкози-галактози.

Застосування у період вагітності або годування груддю. Застосування препарату у період вагітності або годування груддю можливе під контролем лікаря, з урахуванням співвідношення користь/ризик та суворим дотриманням режиму дозування.

Здатність впливати на швидкість реакції при керуванні автотранспортом або іншими механізмами. Препарат не впливає на здатність керувати транспортними засобами та іншими механізмами, однак водіям автотранспорту слід враховувати можливе спотворення результатів дослідження на алкоголь.

Спосіб застосування та дози. Застосовувати дорослим і дітям віком від 3 років місцево на слизові оболонки порожнини рота і носоглотки шляхом зрошування, розпилуючи препарат у порожнину рота протягом 1—2 секунд.

Дорослим зрошування проводять 3—4 рази на добу. Дітям віком від 3 років зрошування проводять 1—2 рази на добу, якщо немає особливих тривалості застосування препарату залежить від перебігу захворювання і зазвичай становить *частота і тривалість застосування встановлюються індивідуально лікарем і залежать від правил користування балоном/флаконом.*

- 2: На шток клапана балона наłożyć насадку горлову (розпиловач), яка додається,
- 3: Стерилізовані балон/флакон протягом 1 хв. і провести не більше 5 натиснень на насадку до появи дисперсного струменя. Дозволяється при відсутності струменя повторити цю
- 4: Вільний кінець розпиловача ввести у порожнину рота, утримуючи балон вертикально,
- 5: Натиснути на головку розпиловача, зриянуть розпилований з розширенням клапана балона і закрити балон
- 6: Розпиловач слід притяти у чистоті після забруднення, промиваючи його під струменем теплої води з подальшим висушуванням у теплому місці.

Діти. Препарат не застосовувати дітям віком до 3 років.

З обережністю застосовувати дітям віком від 3 років у зв'язку з можливістю розвитку рефлекторного бронхоспазму, зумовленого вмістом евкаліптової і м'ятої перцевої ефірних олій. Лікування дітей слід проводити під наглядом лікаря.

Передозування. Випадки передозування не описані. Можливе посилення побічних ефектів препарату.

Лікування: відміна препарату, промивання порожнини рота теплою кип'яченою водою. Симптоматична терапія.

Побічні реакції. В окремих випадках можливі: з боку імунної системи: алергічні реакції, включаючи ангіоневротичний набряк, бронхоспазм.

З боку шкіри: висипи, свербіж, крапив'янка, набряк у місці контакту.

З боку травної системи: нудота, блювання, місцеві ефекти (печіння у роті, клубок у горлі або першіння).

Інші: загальна слабкість, утруднення дихання.

У разі виявлення будь-яких небажаних явищ або незвичних реакцій порадьтеся з лікарем щодо подальшого застосування препарату.

Термін придатності. 1,5 року.

Умови зберігання. Зберігати в оригінальній упаковці при температурі не вище 25 °C.

Зберігати у недоступному для дітей місці.

Упаковка. 1 балон 30 мл з насадкою-роздавачем і захисним ковпачком у коробці; флакон 50 мл з оральним розпиловальним пристроєм і захисним ковпачком у коробці.

1

Категорія відпуску. Без рецептa.

Виробник. Товариство з обмеженою відповідальністю «Фармацевтична компанія «Здоров'я».

Місцезнаходження виробника та адреса місця провадження його діяльності. Україна, 61013, Харківська обл., місто Харків, вулиця Шевченка, будинок 22.