

## ІНСТРУКЦІЯ для медичного застосування лікарського засобу

### УМКАЛОР®

Всі ціни на препарат [УМКАЛОР®](#) можна знайти на сайті [doc.ua](#)

#### Склад:

*діючі речовини:* екстракт з коренів *Pelargonium sidoides* (пеларгонії очиткової) (1:8-10), екстрагент: етанол 11 % (м/м);

1 г розчину містить 800 мг екстракту з коренів *Pelargonium sidoides* (пеларгонії очиткової) (1:8-10), екстрагент: етанол 11 % (м/м);

*допоміжна речовина:* гліцерин 85 %.

**Лікарська форма.** Розчин для перорального застосування.

*Основні фізико-хімічні властивості:* рідина від світло-коричневого до червоно-коричневого кольору.

**Фармакотерапевтична група.** Засоби, що впливають на респіраторну систему.

Код АТХ R05.

#### **Фармакологічні властивості.**

*Фармакодинаміка.*

Препарат містить екстракт із коренів пеларгонії очиткової (*Pelargonium sidoides*).

У дослідженнях на тваринах, після внутрішнього застосування екстракту, спостерігалось пригнічення перебігу хвороби (неспецифічних симптомів хвороби в контексті інфекції) та антиоксидантні властивості.

У тестах *in vitro* було підтверджено такі ефекти препарату Умкалор®:

стимуляція неспецифічних захисних механізмів:

- стимуляція частоти скорочення миготливого епітелію;
- модуляція синтезу інтерферону і прозапальних цитокінів;
- стимулювання активності НК-клітин;
- стимуляція фагоцитів, експресія адгезії молекул, хемотаксис;

антимікробні ефекти:

- помірні прямі антибактеріальні та антивірусні властивості;
- зростання/інгібування адгезії А-стрептококів до десквамативних/живих епітеліальних клітин;
- інгібування бета-лактамази;

цитопротекторні властивості:

- пригнічення лейкоцитарної еластази людини;
- антиоксидантні властивості.

*Фармакокінетика.*

Даних про фармакокінетику препарату поки що немає.

#### **Клінічні характеристики.**

##### **Показання.**

Гострі та хронічні інфекції дихальних шляхів і ЛОР-органів (бронхіт, синусит, тонзиллярна ангіна, ринофарингіт).

##### **Протипоказання.**

Підвищена чутливість до компонентів препарату; підвищена схильність до кровотеч, прийом лікарських засобів, які уповільнюють процес згортання крові; тяжкі захворювання печінки і нирок (через відсутність достатнього досвіду застосування цього лікарського засобу у подібних випадках).

### ***Взаємодія з іншими лікарськими засобами та інші види взаємодій.***

Дотепер повідомлень про це немає.

Через можливу дію препарату Умкалор<sup>®</sup> на параметри згортання крові не виключена імовірність того, що при одночасному застосуванні він може впливати на дію таких непрямих антикоагулянтів як варфарин. При проведенні плацебо-контрольованого подвійного «сліпого» клінічного дослідження з участю здорових добровольців не було виявлено ніяких взаємодій препарату Умкалор<sup>®</sup> із пеніциліном V.

### ***Особливості застосування.***

Якщо симптоми захворювання не зникають протягом 1 тижня, підвищена температура тіла зберігається понад 3 доби або загальний стан погіршується, а також при порушенні функції печінки різного походження, задишці або кров'янистому мокротинні рекомендується проконсультуватися з лікарем.

### ***Застосування у період вагітності або годування груддю.***

Не рекомендується приймати препарат у період вагітності або годування груддю через недостатній клінічний досвід його застосування цій групі пацієнтів.

### ***Здатність впливати на швидкість реакції при керуванні автотранспортом або іншими механізмами.***

При керуванні автотранспортом або роботі з іншими механізмами не вивчався, але слід враховувати, що препарат містить 12 об. % етанолу.

### ***Спосіб застосування та дози.***

Розчин слід приймати з невеликою кількістю рідини за 30 хв до вживання їжі вранці, вдень і ввечері.

У гострій стадії захворювання зазвичай призначають: дорослим і дітям віком від 12 років - по 30 крапель 3 рази на добу; дітям віком від 6 до 12 років - по 20 крапель 3 рази на добу; дітям віком від 1 до 6 років - по 10 крапель 3 рази на добу.

Для профілактики рецидивів і подальшого лікування хронічних захворювань дорослим і дітям віком від 12 років призначають по 10-20 крапель препарату 3 рази на добу.

Середня тривалість курсу лікування гострого захворювання і профілактики рецидивів становить 7-10 днів. Загальна тривалість лікування не повинна перевищувати 3 тижні.

Флакон тримати вертикально, у разі необхідності злегка постукувати по його дну.

### ***Діти.***

Досвід застосування препарату дітям віком до 1 року відсутній, тому Умкалор<sup>®</sup> можна призначати дітям віком від 1 року.

Застосування препарату Умкалор<sup>®</sup> для лікування дітей молодшого віку (від 1 до 6 років) рекомендується під наглядом лікаря.

### ***Передозування.***

Дотепер повідомлень про випадки передозування не надходило. Можливе посилення побічних реакцій.

### ***Побічні реакції.***

*З боку травного тракту:* розлади травного тракту (у тому числі біль у шлунку, печія, нудота, діарея), слабка кровотеча ясен.

*З боку дихальної системи:* слабкі носові кровотечі.

*З боку шкіри/імунної системи:* реакції гіперчутливості (у тому числі висипання на шкірі, кропив'янка, свербіж шкіри і слизових оболонок). У вкрай поодиноких випадках можливі тяжкі реакції гіперчутливості з набряком обличчя, задишкою і зниження артеріального тиску).

*З боку гепатобілярної системи:* підвищення показників функції печінки. Причинно-наслідковий зв'язок між підвищенням цих показників і застосуванням препарату не був продемонстрований.

**Термін придатності. 2 роки.**

Термін придатності розчину після відкриття флакона становить 6 місяці.

*Примітка. В екстрактах рослинного походження у вигляді розчинів з часом може спостерігатися помутніння, яке не впливає на ефективність препарату. Оскільки Умкалор® є лікарським препаратом рослинного походження, можливі незначні зміни його кольору і смаку.*

**Умови зберігання.**

Зберігати при температурі не вище 30 °С у недоступному для дітей місці.

**Упаковка.**

По 20 мл, 50 мл розчину у флаконі; по 1 флакону у картонній коробці.

**Категорія відпуску. Без рецепта.**

**Виробник.**

Др. Вільмар Швабе ГмбХ і Ко. КГ.

**Місцезнаходження виробника та адреса місця провадження його діяльності:**

Вільмар-Швабе-Штрассе 4, 76227 Карлсруе, Німеччина.